

公示稿

如意珍宝丸

Ruyi Zhenbao Wan

【处方】	珍珠母	100 g	沉香	100 g	石灰华	100 g	金礞石	30 g
	红花	100 g	螃蟹	50 g	丁香	40 g	毛诃子(去核)	100 g
	肉豆蔻	40 g	豆蔻	40 g	余甘子	130 g	草果	30 g
	香早芹	40 g	檀香	80 g	黑种草子	40 g	降香	330 g
	荜茇	30 g	诃子	130 g	高良姜	80 g	甘草膏	40 g
	肉桂	50 g	乳香	60 g	木香	80 g	决明子	60 g
	水牛角	40 g	黄葵子	50 g	短穗兔耳草	150 g	藏木香	80 g
	麝香	2 g	牛黄	2 g				

【制法】 以上三十味，除牛黄、水牛角、麝香、甘草膏外，其余粉碎成细粉，加入牛黄、水牛角、麝香细粉，过筛，混匀，用甘草膏加适量水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为红棕色至红褐色水丸；气微香，味苦、甘，性平。

【鉴别】 (1) 取本品粉末，置显微镜下观察：草酸钙针晶众多，细小，散在于射线细胞中(肉桂)；具缘纹孔导管巨大，完整者直径约至 300 μ m，多破碎，具缘孔也大而清晰，管腔内含棕色或黄棕色分泌物(降香)；花粉粒圆形、椭圆形或橄榄形，直径约 60 μ m，具 3 个萌发孔，外壁有齿状突起(红花)。

(2) 取本品 8 丸，研细，加无水乙醇 30ml，超声处理 40 分钟，滤过，滤液加置中性氧化铝柱(100~120 目，10g，内径 1cm)上，收集流出液，浓缩至 2ml，作为供试品溶液。另取木香对照药材 0.2 g，同法制成对照药材溶液。再取丁香酚对照品，加无水乙醇制成每 1ml 含 10 μ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2015 年版通则 0502)试验，吸取上述三种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-环己烷(5:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以香草醛硫酸试液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，日光下，在与对照药材及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点；紫外光灯(365nm)下，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(3) 取本品 10 丸，研细，加乙酸乙酯 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，药渣加乙酸乙酯 10ml，超声处理 5 分钟，滤过，合并滤液，低温回收溶剂干，残渣加乙酸乙酯 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取桂皮醛对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1 μ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2015 年版通则 0502)试验，吸取供试品溶液 5 μ l 与对照品

溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯(8.5:1.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(4) 取本品 10 丸，研细，加甲醇 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，药渣加甲醇 10 ml 超声处理 5 分钟，滤过，合并滤液，回收溶剂至干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取萆薢对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典 2015 年版通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-丙酮(7:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(中国药典 2015 年版通则 0108)。

【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典 2015 年版通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液(26:2:72)为流动相；检测波长为 403nm。理论板数按羟基红花黄色素 A 峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 精密称取羟基红花黄色素 A 对照品适量，加 25%甲醇制成每 1ml 中含 13 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，混匀，取约 0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 25%甲醇 10ml，称定重量，超声处理(功率 300W，频率 50kHz)30 分钟，放冷，再称定重量，用 25%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含红花以羟基红花黄色素 A($C_{27}H_{30}O_{15}$)计，不得少于 0.42 mg。

【功能与主治】 清热止痛，醒脑开窍，舒筋通络，干黄水。用于瘟热、陈旧热症、白脉病，四肢麻木，瘫痪，口眼歪斜，神志不清，痹症，痛风，肢体强直，关节不利。对白脉病有良效。

【用法与用量】 一次 4~5 丸，一日 2 次。

【禁忌】 酸、冷、酒。

【规格】 每丸重 0.5 g

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处。

起草单位：甘肃省药品检验研究院

复核单位：成都市食品药品检验研究院