

公示稿

茴 芹 果

Huiqinguo

رۇمبىديان

PIMPINELLAE ANISI FRUCTUS

本品系维吾尔族习用药材。为伞形科植物洋茴香 *Pimpinella anisum* L. 的干燥成熟果实，夏、秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】 本品为双悬果，多连接，呈卵圆形，长 2.5~4mm，直径约 1.0~2.0mm。表面灰绿色或灰棕色，顶端狭细，有圆盘状突起；基部宽圆，多见残留短小果梗。分果具 5 条明显的肋线，微隆起，肋间具有短刚毛。气芳香，味甜。

【鉴别】 (1) 本品粉末呈棕黄色。非腺毛多碎断，长 25~180 μ m，直径 10~20 μ m。油管碎片呈类圆形，直径 20~40 μ m。纤维呈束，孔沟明显，直径 10~16 μ m；网纹细胞呈长卵圆形或椭圆形，壁稍厚，具横向或网状纹孔；螺纹导管。胚乳细胞含糊粉粒和油滴。

(2) 取本品粉末 1g，加乙醚 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加无水乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取茴香醚对照品，加无水乙醇制成每 1ml 含 1 μ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（17:2.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 磷钼酸乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 杂质 不得过 5%（中国药典 2015 年版通则 2301）。

水分 不得过 10.0%（中国药典 2015 年版通则 0832 第二法）测定。

总灰分 不得过 15.0%（中国药典 2015 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（中国药典 2015 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 201 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【含量测定】 挥发油 取本品最粗粉适量，照挥发油测定法（中国药典 2015 年版通则 2204）测定。

本品含挥发油不得少于 2.5%（ml/g）。

【性味】 二级干热。

【功能与主治】 具生干生热，成熟异常黏液质，温经健肌，散气止痛，利尿通经，补胃催乳等。主治湿寒性或黏液质性疾病，如瘫痪、面瘫，寒性头痛，偏头痛，眩晕，腹胀，腹痛，耳痛，闭尿，闭经，胃虚乳少。

【用法与用量】 3~5g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

起草单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所

复核单位：浙江省食品药品检验研究院

征求意见稿