

# 鹰嘴豆

Yingzuidou

SEMEN CICERIS ARIETINI

本品系维吾尔族习用药材。为豆科植物鹰嘴豆 *Cicer arietinum* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收地上部分，晒干，打下种子，除去杂质，晒干。

**【性状】** 本品呈类球形或圆锥形，基部尖如鹰嘴。长 5~9mm，直径约 4~7mm。表面白色、微红色、淡灰白色、黄白色、棕黄色或红褐色。光滑或有蜂窝状的皱纹，微被短绒毛，种脐处密集。种脐微尖，点状，种孔在喙的腹面。由种脐向下经背部有明显的人字形分叉纹脉。质坚硬。子叶 2，肥厚，黄白色或淡黄色。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

**【鉴别】** 本品粉末淡黄色。栅状细胞成片或单个散在，壁厚无色或浅棕色，具光辉带。淀粉粒极多，单粒呈类球形或卵圆形，长 10~30 $\mu$ m，脐点点状、裂缝状或人字形，层纹明显。导管少见，主要为螺纹导管和网纹导管，直径 10~25 $\mu$ m。薄壁细胞中稀有草酸钙方晶，直径 2~10 $\mu$ m。

**【检查】** 水分 不得过 12.0%（中国药典 2015 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（中国药典 2015 年版通则 2302）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2015 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用无水乙醇作溶剂，不得少于 6.0%。

**【性质】** 一级干热。

**【功能与主治】** 清除异常体液，开通体液闭阻，调补机体。补中益气，温肾壮阳，主消渴，解血毒，润肺止咳。用于身体瘦弱，性欲低下，食欲不振，皮肤瘙痒及糖尿病。

**【用法与用量】** 10~30g。

**【注意】** 本品不易消化，可在胃内产气引起胃痛。

**【贮藏】** 置于干燥通风处。

起草单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所

复核单位：上海市食品药品检验所